



Drontal Puppy
Reg. Q-0715-205

Desparasitante de amplio espectro para perros

FÓRMULA:

Cada 1 mL contiene:

Febantel	15.0 mg
Pamoato de Pyrantel	14.4 mg
Excipiente c.b.p.	1 mL

TIPO DE FORMULACIÓN: Suspensión oral.

INGREDIENTE ACTIVO: Febantel y Pamoato de Pyrantel.

DESCRIPCIÓN

Presentación: Caja con 1 frasco de 20, 50 o 100 mL.

INDICACIONES

Drontal® puppy es un desparasitante de amplio espectro para cachorros de perro, el efecto sinérgico de sus 2 principios activos, Febantel y Pyrantel ofrece un desparasitante único de amplio espectro contra las formas adultas y larvianas de los helmintos más comunes de los perros. El efecto sinérgico comprobado y patentado por Elanco de los componentes de la fórmula de **Drontal® puppy** le confiere un espectro de acción y una potencia más amplias que cualquier otro antihelmíntico en el mercado.

Drontal® puppy está diseñado especialmente para combatir las formas adultas y larvianas de nemátodos gastrointestinales y protozoarios que afectan a los cachorros de perro y a los adultos de perro de talla miniatura. Su espectro incluye:

• *Toxocara canis* • *Toxocara cati* • *Toxascaris leonina* • *Baylisascaris procyonis* • *Ancylostoma caninum* • *Ancylostoma braziliense* • *Ancylostoma tubaeforme* • *Uncinaria stenocephala* • *Trichuris vulpis* • *Giardia* spp.

Modo de acción:


Eficacia

Drontal® puppy ha sido probado en gran cantidad de perros de varias edades, razas y sexos. La eficacia ha sido demostrada en estudios críticos y clínicos contra los nemátodos más comunes de los perros. El pyrantel es un antihelmíntico con alta eficacia contra Ascáridos y Ancylostomas en perros, pero sin eficacia contra Tricúridos. Febantel tiene un espectro de actividad que incluye Ascáridos, Ancylostomas y también Tricúridos.

Efecto sinérgico

Elanco ha desarrollado una fórmula nematicida eficaz y de alta calidad, ya que el pyrantel y el febantel fueron probados por separado y en combinación, logrando un excelente efecto sinérgico contra la mayoría de los nemátodos (*Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Ancylostoma caninum* y *Trichuris vulpis*). Con una sola dosis elimina hasta el 100% de estos parásitos.

Sitios de acción sinérgica de Pyrantel y Febantel (Drontal®) sobre el organismo del parásito:



Efectos de Febantel, de Pyrantel y de la combinación de ambos, sobre las estructuras y órganos de nemátodos.

Organo del parásito	Pyrantel	Febantel	DRONTAL® (Pyrantel y Febantel)
Cutícula	-	-	-
Hipodermis	+	++	+++
Células musculares	+	+ / ++	+++
Intestino	+	- / +	+++
Axones nerviosos	-	+	+++
Sistema sexual	-	+	+++
Canales excretorios	-	+	++

- Sin efecto + Acción leve ++ Acción moderada +++ Alto efecto degenerativo

Desparasitación estratégica

La Desparasitación estratégica reduce el riesgo de enfermedades zoonóticas (enfermedades transmitidas de los animales al hombre) y mantiene a las mascotas saludables.

La Desparasitación Estratégica consiste en desparasitar con un calendario estratégico a sus mascotas para prevenir o reducir parasitosis clínicas y contaminación ambiental. (Consulte a su Médico Veterinario para que le indique el calendario de desparasitación estratégica de acuerdo a su zona).

Las metas de la desparasitación estratégica son:

- Reducir el daño orgánico a las mascotas.
- Prevenir la reproducción del parásito.
- Reducir la contaminación ambiental.
- Reducir las enfermedades zoonóticas.

Se recomienda establecer un programa estratégico de desparasitación de acuerdo a la edad del animal.

Calendario de Desparasitación Estratégica:

Cachorros	<ul style="list-style-type: none">• A partir de las 2 semanas de edad, cada 2 semanas hasta los 3 meses de edad con Drontal® puppy.• Una vez al mes de los 3 a los 6 meses de edad con Drontal® plus.• Cuatro veces por año después de los 6 meses de edad (cada 3 meses) con Drontal® plus.
Perros adultos	Tratar regularmente, considerando la exposición potencial a los parásitos y los periodos de prepatencia (4 veces al año, una vez cada 3 meses).
Perras para cría	<ul style="list-style-type: none">• Antes de la monta.• 2 semanas antes de la fecha probable de parto.• Al parto.• A las 2 y 4 semanas posteriores al parto (conjuntamente con los cachorros).• Continuar una vez cada tres meses.
Adquisición de nuevas mascotas (cachorros y/o adultos)	Desparasitar inmediatamente que llegan al hogar; repetir la dosis en 2 semanas y continuar 1 vez cada tres meses.

Recomendaciones:

Cada *Ancylostoma caninum* adulto ingiere cerca de 0,1 ml de sangre por día, en infestaciones severas puede ser fatal para los cachorros. Durante la migración las larvas producen daño hepático. Las larvas de este parásito pasan la barrera placentaria y los cachorros nacen infestados, otras larvas pasan de la glándula mamaria a la leche, infestando a los cachorros, también penetran activamente por la piel o son ingeridas a partir de un ambiente contaminado.

Los Ancylostomas pueden provocar severas anemias y daño hepático aún antes de manifestarse clínicamente con huevos en las heces de los cachorros. El *Toxocara canis* infesta a los cachorros atravesando la barrera placentaria; llegando a la leche a través de la glándula mamaria; o por la ingestión de huevos. La madre puede eventualmente adquirir estos parásitos ingiriendo aves o roedores silvestres.

Las larvas de estos dos parásitos permanecen inactivas en la musculatura de la madre, provocando infestaciones en camadas consecutivas. Dadas las condiciones de infestación y los períodos de prepatencia de los diferentes parásitos es importante que la madre sea desparasitada de acuerdo al calendario sugerido en este instructivo.

Los perros de razas miniatura pueden ser tratados cada tres meses con esta suspensión. Estudios de toxicidad en los productos indican un amplio margen de seguridad sin contraindicaciones o efectos colaterales







DOSIS Y VÍA ADMINISTRACIÓN

Drontal® puppy debe ser administrado exclusivamente por vía oral en una sola toma.

Drontal® puppy es bien tolerado. Administrar 1 ml por cada kilogramo de peso corporal.

- Administrar directamente por vía oral o junto con el alimento.
- No es necesario restringir la alimentación o administrarlo en ayunas.
- En caso de infestación por *Giardia* spp. el tratamiento deberá administrarse durante dos días consecutivos.

Tabla de dosificación:

Peso del animal	Drontal® puppy	Drontal® plus		Drontal® plus perros grandes	
Cachorros	1 ml/kg de p.c.				
Perros de 2,6 - 5 kg		1/2 tab			
Perros de 5,1 - 10 kg		1 tab			
Perros de 11 - 17,5 kg		2 tab		1/2 tab	
Perros de + de 20 kg				1 tab	
Perros de + de 35 kg				2 tab	

Control de Toxocariasis y Ancylostoma:

- Con el objeto de eliminar infestaciones adquiridas por vía prenatal e infestaciones por leche, se recomienda desparasitar a los cachorros a las 2 semanas de edad y repetir el tratamiento 15 días después con **Drontal® puppy** hasta los tres meses de edad.
- En el caso de las madres se recomienda el tratamiento al mismo tiempo que en los cachorros con **Drontal® plus**.
- Con el objeto de eliminar infestaciones adquiridas por vía prenatal, es necesario realizar un tratamiento estratégico en los cachorros de dos semanas de edad para eliminar la posible transmisión de Toxocaras y Ancylostomas vía lactogénica o por reinfestación de huevos eliminados en las heces, y evitar la contaminación del medio ambiente con huevos, pues estos sirven como fuente de reinfección por años.

Control estratégico contra Dipylidium caninum:

Los nemátodos del perro constituyen un serio riesgo para la salud del hombre. Debido a que las pulgas juegan un importante papel, como huésped intermediario, dentro del ciclo de vida del *Dipylidium caninum*, es necesario efectuar un control simultáneo y estratégico contra las pulgas. Se recomienda el uso de Advantage o Advantix y en el entorno ambiental la aplicación de Super Bolfo Reforzado, para el control de pulgas. Consulte al Médico Veterinario para adecuar el tratamiento a cada situación particular. Se recomienda potabilizar el agua de sus mascotas.

ADVERTENCIAS:

- No administrar simultáneamente con compuestos piperazínicos.
- No administrar después de la fecha de caducidad.
- Conservar en lugar fresco y seco.
- No se exponga a la luz solar directa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales.
- Agítese antes de usar.

"Uso Veterinario"
"Consulte al Médico Veterinario"
"Su venta Requiere Receta Médica".

Elanco Salud Animal S.A. de C.V.
Boulevard Puerta de Hierro No.5153,
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,
Zapopan C.P. 45116, Jalisco.
Tel.: 800 288 5553