

11.07.2025

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Дронтал™ плюс зі смаком м'яса

2. Склад

Одна таблетка містить діючі речовини:

фебантел - 150 мг;

пірантелу ембонат – 144 мг;

празіквантел – 50 мг.

Допоміжні речовини: кукурудзяний крохмаль, моногідрат лактози, мікрокристалічна целюлоза, повідон К25, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, колоїдний безводний діоксид кремнію, натрій кроскармелоза, смакова добавка м'яса.

3. Фармацевтична форма

Таблетки.

4. Фармакологічні властивості

АТС vet QP52 антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)

4.1. Фармакодинаміка

Дронтал™ плюс зі смаком м'яса – ефективний препарат проти круглих, стьожкових червів та найпростіших (*Giardia* spp.), який містить діючі речовини: фебантел, пірантелу ембонат, празіквантел.

Комбінація діючих речовин пірантелу та фебантелу, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод (аскарид, унцинарій, волосоголовців) та найпростіших *Giardia* у собак. Зокрема, спектр дії: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria Stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis* та *Giardia* spp.

Празіквантел активний проти цестод у собак: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus* та *Echinococcus multilocularis*. Празіквантел діє проти всіх кишкових личинкових стадій цих паразитів. Також празіквантел активний проти деяких видів збудників протозойних захворювань (*Giardia* spp.), що описано в літературних джерелах.

4.2. Фармакокінетичні властивості

Пірантел діє як холінергічний антагоніст, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполаризуючої нервово-м'язової блокади.

Антигельмінтна ефективність фебантелу зумовлена його здатністю гальмувати процес полімеризації тубуліну в мікроканальцях. У результаті структурних та функціональних метаболічних розладів виснажуються енергетичні запаси паразитів, внаслідок чого настає їх загибель на 2-3 добу.

Празіквантел швидко всмоктується через зовнішню оболонку стьожкових гельмінтів, внаслідок чого настає її пошкодження та скорочення. Це призводить до руйнування зовнішньої оболонки, розладів метаболізму і загибелі паразита.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

5.2 Показання до застосування

1. Профілактика та лікування цуценят і дорослих собак при ураженні:

- нематодами - *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (личинкові, молоді та статевозрілі стадії), *Ancylostoma caninum* (молоді та статевозрілі стадії), *Uncinaria stenocephala* (молоді та статевозрілі стадії), *Trichuris vulpis* (молоді та статевозрілі стадії);

- цестодами (преімагінальні та імагінальні стадії) - *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Echinococcus granulosus*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocestoides* spp.

2. Лікування протозойних захворювань цуценят і дорослих собак, викликаних *Giardia* spp.

5.3 Протипоказання

11.07.2025

Не використовувати при відомій гіперчутливості тварини до складових препарату!

5.4 Побічна дія

Іноді (дуже рідко, 1 випадок із 10 000) можливі легкі та швидкоминучі розлади роботи травного каналу (блювота, діарея). Анорексія, млявість, гіперактивність.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати вагітним самкам у перші два триместри вагітності!

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з іншими протипаразитарними препаратами, особливо з піперазином!

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Рекомендована доза - 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини (15 мг фебантелу, 14,4 мг пірантелу ембонату та 5 мг празіквантелу на 1 кг маси тіла).

Дози препарату, залежно від маси тіла:

Маса тіла тварини, кг	Кількість таблеток, шт
1-5	1/2
>5-10	1
>10-15	1 1/2
>15-20	2

Застосування: перорально, з кормом або примусово на корінь язика. Без дотримання дієти. Рекомендують застосовувати перед годівлею.

Тривалість лікування: одноразово. При необхідності повторити через 2 тижні.

Дегельмінтизацію рекомендують проводити 1 раз у квартал.

Не застосовувати собакам, масою тіла до 1 кг.

Лікування гіардіозу (лямбліозу) (*Giardia spp.*): рекомендована доза - 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини (15 мг фебантелу, 14,4 мг пірантелу ембонату та 5 мг празіквантелу на 1 кг маси тіла), застосовують впродовж 3 днів.

Одноразове застосування в період третього триместру вагітності або під час лактації показало безпечність лікування.

Для запобігання повторних інвазій необхідно утримувати у чистоті місця перебування тварин.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Передозування препарату в 10 разів було толерантним, без симптомів передозування у собак і цуценят.

5.10 Спеціальні застереження

Не застосовувати собакам масою тіла до 1 кг.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначають.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Після роботи з препаратом вимити руки.

У випадку випадкового проковтування препарату, негайно звернутися за медичною допомогою та показати лікарю листівку-вкладку або етикетку.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Несумісний із піперазином!

6.2 Термін придатності

5 років. Розділені навпіл таблетки - 7 днів.

6.3 Особливі заходи зберігання

11.07.2025

Зберігати препарат у недоступному для дітей місці, за температури від 0 до 25 °С.
Після відкриття блистера, залишки поділених навпіл таблеток загорнути у фольгу і покласти назад у блистер.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Блістери з фольги по 2, 4, 6, 10, 24 таблеток, заповані в картонні коробки.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний або протермінований препарат утилізують відповідно до чинного законодавства.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ

Elanco GmbH

Хайнц-Ломан-Штр. 4,

Heinz-Lohmann-Str. 4,

27472 Куксхафен, Німеччина

27472 Cuxhaven, Germany

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

KVP Pharma + Veterinaer-Produkte GmbH

Проенсдорфер стр. 324,

Projensdorfer Str. 324,

24106 Кіль, Німеччина

24106 Kiel, Germany

9. Додаткова інформація

11.07.2025

**Дронтал™ плюс зі смаком м'яса
(таблетки)
листівка-вкладка**

Опис

Таблетки у формі кісточки від світло коричневого до коричневого кольору зі смаком м'яса, із рискою на обох сторонах, що дозволяє розділити таблетку навпіл.

Склад

Одна таблетка містить діючі речовини:

фебантел - 150 мг;

пірантелу ембонат - 144 мг;

празіквантел - 50 мг.

Допоміжні речовини: кукурудзяний крохмаль, моногідрат лактози, мікрокристалічна целюлоза, повідон К25, магнію стеарат, натрій лаурилсульфат, колоїдний безводний діоксид кремнію, натрій кроскармелоза, смакова добавка м'яса.

Фармакологічні властивості

АТС vet QP52 антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)

1. Фармакодинаміка

Дронтал™ плюс зі смаком м'яса – ефективний препарат проти круглих, стьожкових черв'яків та найпростіших (*Giardia* spp.), який містить діючі речовини: фебантел, пірантелу ембонат, празіквантел.

Комбінація діючих речовин *пірантелу* та *фебантелу*, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод (аскарид, унцинарій, волосоголовців) та найпростіших *Giardia* у собак. Зокрема, спектр дії: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria Stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis* та *Giardia* spp.

Празіквантел активний проти цестод у собак: *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosis* та *Echinococcus multilocularis*. Празіквантел діє проти всіх кишкових личинкових стадій цих паразитів. Також празіквантел активний проти деяких видів збудників протозойних захворювань (*Giardia* spp.), що описано в літературних джерелах.

2. Фармакокінетичні властивості

Пірантел діє як холінергічний антагоніст, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполаризуючої нервово-м'язової блокади.

Антигельмінтна ефективність фебантелу зумовлена його здатністю гальмувати процес полімеризації тубуліну в мікроканальцях. У результаті структурних та функціональних метаболічних розладів виснажуються енергетичні запаси паразитів, внаслідок чого настає їх загибель на 2-3 добу.

Празіквантел швидко всмоктується через зовнішню оболонку стьожкових гельмінтів, внаслідок чого настає її пошкодження та скорочення. Це призводить до руйнування зовнішньої оболонки, розладів метаболізму і загибелі паразита.

Застосування

1. Профілактика та лікування цуценят і дорослих собак при ураженні:

- нематодами - *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (личинкові, молоді та статевозрілі стадії), *Ancylostoma caninum* (молоді та статевозрілі стадії), *Uncinaria Stenocephala* (молоді та статевозрілі стадії), *Trichuris vulpis* (молоді та статевозрілі стадії);

- цестодами (преімагінальні та імагінальні стадії) - *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Echinococcus granulosis*, *Alveococcus multilocularis*, *Mesocostoides* spp.

2. Лікування протозойних захворювань цуценят і дорослих собак, викликаних *Giardia* spp.

Дозування

Рекомендована доза - 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини (15 мг фебантелу, 14,4 мг пірантелу ембонату та 5 мг празіквантелу на 1 кг маси тіла).

Дози препарату, залежно від маси тіла:

11.07.2025

Маса тіла тварини, кг	Кількість таблеток, шт
1-5	1/2
>5-10	1
>10-15	1 1/2
>15-20	2

Застосування: перорально, з кормом або примусово на корінь язика. Без дотримання дієти. Рекомендують застосовувати перед годівлею.

Тривалість лікування: одноразово. При необхідності повторити через 2 тижні.

Дегельмінтизацію рекомендують проводити 1 раз у квартал.

Не застосовувати собакам, масою тіла до 1 кг.

Лікування гіардіозу (лямбліозу) (*Giardia spp.*): рекомендована доза - 1 таблетка на 10 кг маси тіла тварини (15 мг фебантелу, 14,4 мг пірантелу ембонату та 5 мг празіквантелу на 1 кг маси тіла), застосовують впродовж 3 діб.

Одноразове застосування в період третього триместру вагітності або під час лактації показало безпеку лікування.

Для запобігання повторних інвазій необхідно утримувати у чистоті місця перебування тварин.

Протипоказання

Не використовувати при відомій гіперчутливості тварини до складових препарату!

Застереження

Не застосовувати собакам масою тіла до 1 кг.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати вагітним самкам у перші два триместри вагітності!

Побічна дія

Іноді (дуже рідко, 1 випадок із 10 000) можливі легкі та швидкоминучі розлади роботи травного каналу (блювота, діарея). Анорексія, млявість, гіперактивність.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Після роботи з препаратом вимити руки.

У випадку випадкового проковтування препарату, негайно звернутися за медичною допомогою та показати лікарю листівку-вкладку або етикетку.

Форма випуску

Блістери з фольги по 2, 4, 6, 10, 24 таблеток, запаковані в картонні коробки.

Зберігання

Зберігати препарат у недоступному для дітей місці, за температури від 0 до 25 °С.

Після відкриття блистера, залишки поділених навпіл таблеток загорнути у фольгу і покласти назад у блистер.

Термін придатності

5 років. Розділені навпіл таблетки - 7 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ
Хайнц-Ломан-Штр. 4,
27472 Куксхафен, Німеччина

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4,
27472 Cuxhaven, Germany

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проєнсдорфер стр. 324,
24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma + Veterinaer-Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel, Germany