



Profender® Spot-On

Reg. Q-0615-103
Solución tópica

Desparasitante interno con aplicación externa tópica (spot-on) para el tratamiento de parasitosis causadas por nematodos y cestodos en gatos

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Emodepside	21.4 mg
Praziquantel	85.8 mg
Excipiente, c.b.p. 1 mL.	

Cada pipeta de PROFENDER® SPOT-ON contiene:

	Volumen	Emodepside	Praziquantel
PROFENDER® Gato chico (0.5-2.5 kg)	0.35 mL	7.5 mg	30 mg
PROFENDER® Gato mediano (2.5-5 kg)	0.70 mL	15 mg	60 mg
PROFENDER® Gato grande (5-8 kg)	1.12 mL	24 mg	96 mg



INDICACIONES:

Para el tratamiento y prevención de infecciones parasitarias mixtas en gatos mayores de 8 semanas y 0.5 kg, causadas por gusanos redondos (nematodos) y gusanos planos (cestodos) de las siguientes especies:

- Gusanos redondos (nematodos):
 - *Toxocara cati* (adulto maduro, adulto inmaduro, L4 y L3).
 - *Toxascaris leonina* (adulto maduro, adulto inmaduro y L4).
 - *Ancylostoma tubaeforme* (adulto maduro, adulto inmaduro y L4).
- Gusanos planos (cestodos):
 - *Dipylidium caninum* (adulto).
 - *Taenia taeniaeformis* (adulto).
 - *Echinococcus multilocularis* (adulto).

MÉTODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica, para uso externo solamente.

1. Sujete la pipeta en posición vertical, gire y retire la tapa.
2. Quite el sello, voltee la tapa, colóquela de nuevo en la pipeta y presione dando un pequeño giro.
3. Coloque al gato de pie y separe el pelo de la base del cráneo con los dedos hasta que la piel sea visible.
4. Sitúe la punta de la pipeta sobre la piel y apriete varias veces hasta aplicar todo el contenido. Lave las manos después de la aplicación.
5. Aplicar una pipeta al mes.

CONTRAINDICACIONES: No se use en gatitos menores de 8 semanas de edad o menores de 0.5 kg.

ADVERTENCIAS: No se administre por vía oral ni parenteral. Evite que el gato tratado u otros gatos laman el sitio de aplicación mientras esté húmedo.

Existe experiencia limitada con el uso del producto en animales enfermos o debilitados, por lo tanto, en estos animales sólo se debe usar el producto con base en una valoración del riesgo-beneficio.

EFFECTOS ADVERSOS: Puede ocurrir vómito y salivación ocasional. Estos efectos ocurren probablemente como resultado de que el gato lama el sitio de la aplicación inmediatamente después del tratamiento.

PRESENTACIONES:

PROFENDER® Gato chico (0.5-2.5 kg): 0.35 mL.
PROFENDER® Gato mediano (2.5-5 kg): 0.70 mL.
PROFENDER® Gato grande (5-8 kg): 1.12 mL.

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Tel: 5713 2001

www.bayersanidadanimal.com.mx

www.mascotas.bayer.com.mx

Uso Veterinario. Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.

Profender® Spot-On Reg: Q-0615-103
(Emodepside, Praziquantel)

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.

USO EN:

