

29.03.2024

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

Адвантейдж

### 2. Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

імідаклоприд – 100 мг.

Допоміжні речовини: спирт бензиловий, пропілену карбонат, антиоксидант бутилгідрокситолуен.

### 3. Фармацевтична форма

Розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення.

### 4. Фармакологічні властивості

АТС vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX17, імідаклоприд).

Діюча речовина препарату Імідаклоприд, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита. Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців зумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин.

Дослідження довели, що на додаток до ефективності проти зрілих особин бліх, імідаклоприд також ефективний проти личинкових стадій бліх у місцях перебування оброблених тварин. Личинки бліх, що знаходяться безпосередньо в місцях перебування дрібних домашніх тварин, гинуть після контакту із тваринами обробленими імідаклопридом.

Після точкового нанесення препарату в котів імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1 Вид тварин

Коти, декоративні кролі.

#### 5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування котів і декоративних кролів при ураженні блохами *Ctenocephalides felis*.

Блохи гинуть впродовж 1-го дня після застосування препарату. Одна обробка захищає котів від повторної інвазії протягом 4 тижнів, а декоративних кролів - протягом 1 тижня.

Препарат можна застосовувати в комплексній терапії алергічного дерматиту, викликаного блохами (БАД) у котів, якщо захворювання було діагностовано лікарем ветеринарної медицини.

#### 5.3 Протипоказання

Не застосовувати кошенятам віком до 8-ми тижнів.

Не застосовувати декоративним кролям віком до 10-ти тижнів.

Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначено для вживання в їжу людям.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

#### 5.4 Побічна дія

Препарат гіркий на смак і може викликати салівацію в тварин при злизуванні препарату в місці нанесення на шкіру відразу після застосування, але це не є ознакою інтоксикації. Ознаки гіперсалівації зникають через декілька хвилин без лікування.

У дуже рідкісних випадках (менш, ніж у 1 тварини на 10 000 тварин, включаючи окремі повідомлення) в котів та декоративних кролів можуть виникнути такі шкірні реакції, як випадіння шерсті, почервоніння, свербіж та ураження шкіри. Також повідомлялося про збудження, надмірне слиновиділення та ознаки розладу нервової системи, такі як порушення координації, тремор і депресії, але виключно в котів.

29.03.2024

Проковтування препарату може призвести до шлунково-кишкових розладів (блювота та діарея), які спостерігалися в дуже рідкісних випадках на підставі пост-маркетингових даних.

### 5.5 Особливі застереження при використанні

Препарат для місцевого застосування, точкового нанесення, не призначений для застосування перорально.

Наносити лише на непошкоджену шкіру.

Обробку тварин препаратом треба проводити обережно, щоб вміст піпетки не потрапив тварині в очі чи в ротovu порожнину.

Не дозволяти щойно обробленим тваринам облизувати одне одного. Для запобігання злизування препарату тваринами не допускати контакту оброблених препаратом тварин між собою та з іншими тваринами до повного висихання шкіри.

Будь-який нашійник необхідно зняти із тварини перед застосування препарату.

Перед тим як знову надягти на тварину нашійник, необхідно переконатися (візуально оцінити), що оброблена ділянка суха.

### 5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не спостерігалось репродуктивної токсичності в щурів, а також первинної ембріотоксичності чи тератогенності під час досліджень у щурів і кроликів. Дослідження на вагітних і лактуючих самках разом з їх потомством обмежені. Наразі наявні дані свідчать, що побічної дії в цих тварин не очікується.

### 5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

При дворазовому підвищенні рекомендованої дози препарату та одночасному застосуванні таких ветеринарних препаратів, як луфенорон, пірантел, празиквантел (коти) несумісності не спостерігалось. Також доведена сумісність препарату при одночасному використанні багатьох ветеринарних препаратів, у тому числі, і вакцин.

### 5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат для місцевого застосування, точкового нанесення, не призначений для застосування перорально.




Перед лікуванням тварину необхідно зважити для визначення точної ваги тварини.

Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні піпетки препарату:

| Коти/декоративні кролі масою тіла, кг | Назва препарату | Кількість піпеток | Імідаклоприд (мг/кг м. т.) |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| < 4 кг                                | Адвантейдж 40   | 1 x 0,4 мл        | Мінімум 10                 |
| ≥ 4 кг                                | Адвантейдж 80   | 1 x 0,8 мл        | Мінімум 10                 |


#### Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, тримайте у вертикальному положенні. Зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши пломбу.



29.03.2024

Розділіть шерсть на шиї тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб нанести увесь вміст безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкоджену шкіру. Не допускати щойно оброблених тварин вилізувати одне одного!

#### **5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антитоди)**

При 5-кратному перевищенні рекомендованої дози препарату для котів та застосуванні щотижня впродовж 8-ми тижнів поспіль та 4-кратному перевищенні для кролів і застосуванні щотижня впродовж 4-х тижнів поспіль, у тварин не спостерігалось несприятливих клінічних ознак.

#### **5.10 Спеціальні застереження**

Повторне ураження блохами із навколишнього середовища може тривати впродовж 6 тижнів і більше після початку лікування тварини. Тому може знадобитися більше однієї обробки тварини препаратом, залежно від присутності бліх у навколишньому середовищі. Щоб зменшити ураження із навколишнього середовища, рекомендовано додатково застосовувати відповідні інсектицидні засоби проти дорослих бліх та їх незрілих стадій у навколишньому середовищі. Для зменшення ураження блохами із навколишнього середовища необхідно обробляти всіх котів та декоративних кролів, що знаходяться в помешканні. Лікування самок у період лактації забезпечує контроль зараження блохами як у самок, так і в їх потомства.

Препарат не втрачає ефективності при намоканні шерсті тварини, наприклад, після сильного дощу, але в таких випадках може бути необхідна додаткова обробка препаратом – залежно від наявності бліх у навколишньому середовищі. У таких випадках не рекомендується обробляти тварину частіше, ніж 1 раз на тиждень.

#### **5.11 Період виведення (каренція)**

Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначено для вживання в їжу людям.

#### **5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

Людам з відомою підвищеною чутливістю до імідаклоприду слід уникати контакту з препаратом.

Цей препарат містить бензиловий спирт і може викликати сенсibilізацію шкіри або тимчасові шкірні реакції в рідкісних випадках (наприклад, подразнення, поколювання).

Уникати контакту препарату із шкірою, очима та ротовою порожниною. Не масажувати місце нанесення препарату.

Під час роботи з препаратом не можна приймати їжу, пити і палити.

При попаданні препарату на шкіру необхідно відразу промити водою з милом. При попаданні препарату в очі необхідно ретельно промити очі водою.

Якщо подразнення шкіри або очей не зникає, необхідно звернутися до лікаря.

Якщо випадково проковтнули препарат, необхідно негайно звернутися до лікаря.

29.03.2024

Після нанесення препарату не можна гладити тварину до повного висихання місця нанесення препарату.

Після роботи з препаратом необхідно ретельно вимити руки.

Розчинник, що входить до складу препарату, може залишати плями та псувати такі матеріали як шкіра, тканини, пластик, поверхню меблів. Якщо тварини утримуються в квартирі і мають доступ до меблів, то після обробки їх необхідно утримувати окремо до повного висихання препарату в місці нанесення.

#### **6. Фармацевтичні особливості**

##### **6.1 Форми несумісності (основні)**

Невідомі.

##### **6.2 Термін придатності**

5 років.

##### **6.3 Особливі заходи зберігання**

Препарат зберігають за температури не вище 30 °С.

Блістери із піпетками необхідно зберігати в зовнішній упаковці.

##### **6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування**

Поліпропіленові піпетки із ковпачками, 0, 4 мл (Адвантейдж 40) та 0,8 мл (Адвантейдж 80).

Піпетки запаковані в блістери по 2, 3, 4, або 6 піпеток у блістері.

##### **6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками**

Невикористаний препарат та тара повинні бути знешкодовані у відповідності з національними вимогами.

#### **7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення**

Еланко ГмбХ,  
Хайнц-Ломан-Штр. 4,  
27472 Куксхафен, Німеччина

Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Str. 4,  
27472 Cuxhaven, Germany

#### **8. Назва і місце знаходження виробника**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,  
Проєнсдорфер стр. 324,  
24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma + Veterinaer-Produkte  
GmbH  
Projensdorfer Str. 324,  
24106 Kiel, Germany

#### **9. Додаткова інформація**

29.03.2024

**Адвантейдж**  
**(розчин для зовнішнього застосування, точкового нанесення)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Прозорий розчин від жовтого до світло-коричневого кольору.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

імідаклоприд – 100 мг.

Допоміжні речовини: спирт бензиловий, пропілену карбонат, антиоксидант бутилгідрокситолуен.

**Фармакологічні властивості**

**АТС vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX17, імідаклоприд).**

Діюча речовина препарату *Імідаклоприд*, 1-(6-*Chloro-3-pyridylmethyl*)-*N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine* – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита. Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців зумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин.

Дослідження довели, що на додаток до ефективності проти зрілих особин бліх, імідаклоприд також ефективний проти личинкових стадій бліх у місцях перебування оброблених тварин. Личинки бліх, що знаходяться безпосередньо в місцях перебування дрібних домашніх тварин, гинуть після контакту із тваринами обробленими імідаклопридом.

Після точкового нанесення препарату в котів імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

**Застосування**

Профілактика та лікування котів і декоративних кролів при ураженні блохами *Stenoccephalides felis*.

Блохи гинуть впродовж 1-го дня після застосування препарату. Одна обробка захищає котів від повторної інвазії протягом 4 тижнів, а декоративних кролів - протягом 1 тижня.

Препарат можна застосовувати в комплексній терапії алергічного дерматиту, викликаного блохами (БАД) у котів, якщо захворювання було діагностовано лікарем ветеринарної медицини.

**Дозування**

Препарат для місцевого застосування, точкового нанесення, не призначений для застосування перорально.

Перед лікуванням тварину необхідно зважити для визначення точної ваги тварини.




Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні піпетки препарату:

| Коти/декоративні кролі масою тіла, кг | Назва препарату | Кількість піпеток | Імідаклоприд (мг/кг м. т.) |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| < 4 кг                                | Адвантейдж 40   | 1 x 0,4 мл        | Мінімум 10                 |
| ≥ 4 кг                                | Адвантейдж 80   | 1 x 0,8 мл        | Мінімум 10                 |



**Спосіб застосування:**

Вийміть піпетку з упаковки, тримайте у вертикальному положенні. Зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши пломбу.

29.03.2024



Розділіть шерсть на шиї тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб нанести увесь вміст безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкоджену шкіру. Не допускати щойно оброблених тварин вилизувати одне одного !

#### **Протипоказання**

Не застосовувати кошенятам віком до 8-ми тижнів.

Не застосовувати декоративним кролям віком до 10-ти тижнів.

Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначено для вживання в їжу людям.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

#### **Застереження**

Препарат для місцевого застосування, точкового нанесення, не призначений для застосування перорально.

Наносити лише на непошкоджену шкіру.

Обробку тварин препаратом треба проводити обережно, щоб вміст піпетки не потрапив тварині в очі чи в ротову порожнину.

Не дозволяти щойно обробленим тваринам облизувати одне одного. Для запобігання злизування препарату тваринами не допускати контакту оброблених препаратом тварин між собою та з іншими тваринами до повного висихання шкіри.

Будь-який нашійник необхідно зняти із тварини перед застосування препарату.

Перед тим як знову надягти на тварину нашійник необхідно переконатися (візуально оцінити), що оброблена ділянка суха.

#### **Спеціальні застереження**

Повторне ураження блохами із навколишнього середовища може тривати впродовж 6 тижнів і більше після початку лікування тварини. Тому може знадобитися більше однієї обробки тварини препаратом, залежно від присутності бліх у навколишньому середовищі. Щоб зменшити ураження із навколишнього середовища, рекомендовано додатково застосовувати відповідні інсектицидні засоби проти дорослих бліх та їх незрілих стадій у навколишньому середовищі. Для зменшення

29.03.2024

ураження блохами із навколишнього середовища необхідно обробляти всіх котів та декоративних кролів, що знаходяться в помешканні. Лікування самок у період лактації забезпечує контроль зараження блохами як у самок, так і в їх потомства.

Препарат не втрачає ефективності при намоканні шерсті тварини, наприклад, після сильного дощу, але в таких випадках може бути необхідна додаткова обробка препаратом – залежно від наявності бліх у навколишньому середовищі. У таких випадках не рекомендується обробляти тварину частіше, ніж 1 раз на тиждень.

#### *Побічна дія*

Препарат гіркий на смак і може викликати саливацію в тварин при злизуванні препарату в місці нанесення на шкіру відразу після застосування, але це не є ознакою інтоксикації. Ознаки гіперсаливації зникають через декілька хвилин без лікування.

У дуже рідкісних випадках (менш, ніж у 1 тварини на 10 000 тварин, включаючи окремі повідомлення) в котів та декоративних кролів можуть виникнути такі шкірні реакції, як випадіння шерсті, почервоніння, свербіж та ураження шкіри. Також повідомлялося про збудження, надмірне слиновиділення та ознаки розладу нервової системи, такі як порушення координації, тремор і депресії, але виключно в котів.

Проквтування препарату може призвести до шлунково-кишкових розладів (блювота та діарея), які спостерігалися в дуже рідкісних випадках на підставі пост-маркетингових даних.

#### *Використання під час вагітності, лактації, несучості*

Не спостерігалось репродуктивної токсичності в щурів, а також первинної ембріотоксичності чи тератогенності під час досліджень у щурів і кроликів. Дослідження на вагітних і лактуючих самках разом з їх потомством обмежені. Наразі наявні дані свідчать, що побічної дії в цих тварин не очікується.

#### *Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)*

При 5-кратному перевищенні рекомендованої дози препарату для котів та застосуванні щотижня впродовж 8-ми тижнів поспіль та 4-кратному перевищенні для кролів і застосуванні щотижня впродовж 4-х тижнів поспіль у тварин не спостерігалось несприятливих клінічних ознак.

#### *Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу*

Людям з відомою підвищеною чутливістю до імідаклоприду слід уникати контакту з препаратом.

Цей препарат містить бензиловий спирт і може викликати сенсibiliзацію шкіри або тимчасові шкірні реакції в рідкісних випадках (наприклад, подразнення, поколювання).

Уникати контакту препарату із шкірою, очима та ротовою порожниною. Не масажувати місце нанесення препарату.

Під час роботи з препаратом не можна приймати їжу, пити і палити.

При попаданні препарату на шкіру необхідно відразу промити водою з милом. При попаданні препарату в очі необхідно ретельно промити очі водою.

Якщо подразнення шкіри або очей не зникає, необхідно звернутися до лікаря.

Якщо випадково проковтнули препарат, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Після нанесення препарату не можна гладити тварину до повного висихання місця нанесення препарату.

Після роботи з препаратом необхідно ретельно вимити руки.

Розчинник, що входить до складу препарату, може залишати плями та псувати такі матеріали як шкіра, тканини, пластик, поверхню меблів. Якщо тварини утримуються в квартирі і мають доступ до меблів, то після обробки їх необхідно утримувати окремо до повного висихання препарату в місці нанесення.

#### *Форма випуску*

Поліпропіленові піпетки із ковпачками, 0, 4 мл (Адвантейдж 40) та 0,8 мл (Адвантейдж 80). Піпетки запаковані в блістери по 2, 3, 4, або 6 піпеток у блістері.

#### *Зберігання*

Препарат зберігають за температури не вище 30 °С.

Блістери із піпетками необхідно зберігати в зовнішній упаковці.

**Термін придатності**  
5 років.

**29.03.2024**

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

Еланко ГмбХ,  
Хайнц-Ломан-Штр. 4,  
27472 Куксхафен, Німеччина

Elanco GmbH  
Heinz-Lohmann-Str. 4,  
27472 Cuxhaven, Germany

**Виробник готового продукту**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,  
Проенсдорфер стр. 324,  
24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma + Veterinaer-Produkte  
GmbH  
Projensdorfer Str. 324,  
24106 Kiel, Germany