



Drontal® Puppy

Reg. Q-0615-077

Suspensión oral

Endoparasitocida para cachorros y perros jóvenes

FÓRMULA:

Cada mL contiene:

Pamoato de pyrantel	14.4 mg
Febantel	15 mg
Excipientes, c.b.p.1 mL.	



USO EN:



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: DRONTAL® PUPPY es una suspensión nematocida, que contiene una asociación de dos principios activos: febantel y pamoato de pyrantel.

Esta formulación presenta los siguientes beneficios:

1. Espectro de acción que incluye ascáridos, ancylostomas y tricúridos.
2. Gran eficacia, debido a la acción sinérgica entre febantel y el pyrantel.
3. Dosis única por tratamiento.
4. Sabor agradable que permite la administración directamente a la boca del animal, o bien puede administrarlo con los alimentos.
5. Excelente tolerancia.

INDICACIONES: DRONTAL® PUPPY posee un amplio espectro de acción nematocida que ataca las infestaciones causadas por las principales especies de vermes caninos debido al efecto sinérgico de los dos principios activos. El espectro de acción incluye los principales nematodos de mayor importancia en los cachorros caninos:

Ascáridos: *Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*.

Ancylostomas: *Ancylostoma caninum* y *Uncinaria stenocephala*.

Tricúridos: *Trichuris vulpis*.

Protozoarios: *Giardia spp.*



Calendario de desparasitación estratégica



Cachorros

- Cada 2 semanas (de 2 semanas a 3 meses de vida)
- Cada mes (de 3 a 6 meses de vida)
- Cada 3 meses (a partir de 6 meses de vida)

DOSIS: 1 mL por cada 1 kg de p.c., administrar vía oral. Se recomienda implementar un programa estratégico de desparasitación, iniciando a las 2 semanas de edad.

Un adecuado programa de desparasitación se realiza administrando un tratamiento cada 15 días desde las 2 semanas de edad y hasta los 3 meses, continuando con un tratamiento mensual de los 3 a los 6 meses y repitiendo las desparasitaciones cada tres meses. Para el tratamiento vs. *Giardia spp.* en perros, se recomienda administrar 1 mL/kg durante 2 días consecutivos.

MODO DE EMPLEO: DRONTAL® PUPPY se administra en una sola dosis.

La suspensión se aplica por vía oral directo en el hocico del cachorro con una jeringa graduada o sobre el alimento.

No es necesario implementar medidas dietéticas especiales, ni restringir el alimento antes o después del tratamiento.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Estudios de toxicidad en los productos indican un amplio margen de seguridad sin contraindicaciones o efecto colaterales.

No se deje al alcance de los niños.

Manténgase en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN: Envase plástico con 20 mL de suspensión.

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Tel: 5713 2001

www.bayersanidadanimal.com.mx

www.mascotas.bayer.com.mx

Uso Veterinario. Consulte al Médico Veterinario.
Su Venta Requiere Receta Médica.

Drontal® Puppy Reg: Q-0615-077
(Pyrantel, Febantel)

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.

Drontal® Plus

Reg. Q-0615-055
 Tabletas orales
Desparasitante de amplio espectro para perros

FÓRMULA:

Praziquantel	50 mg
Pyrantel	144 mg
Febantel	150 mg



USO EN: de 10 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: DRONTAL® PLUS es un desparasitante de amplio espectro, compuesto por una combinación de praziquantel, pamoato de pyrantel y febantel (combinación sinérgica).

INDICACIONES: DRONTAL® PLUS posee un espectro de acción amplio. Los ámbitos de aplicación son en las infestaciones por los cestodos y nematodos del perro:

Nematodos: *Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*.

Anquilostomas como: *Uncinaria stenocephala* y *Ancylostoma caninum*.

Tricúridos como: *Trichuris vulpis*.

Protozoarios: *Giardia spp.*

Cestodos como: *Echinococcus spp.*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps spp.* y *Mesocostoides spp.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: 1 tableta por cada 10 kg de peso corporal.

Para el tratamiento de *Giardia spp.* se recomienda administrar 1 tableta por cada 10 kg de p.v.c. durante 3 días consecutivos.



Calendario de desparasitación estratégica



Cachorros

Cada 2 semanas (de 2 semanas a 3 meses de vida)
 Cada mes (de 3 a 6 meses de vida)
 Cada 3 meses (a partir de 6 meses de vida)



Nuevas mascotas

Inmediatamente
 Repetir en 2 semanas
 Cada 3 meses



Adultos

Cada 3 meses



Perras de crianza

Antes de la monta
 Momento del parto
 2 Semanas postparto (junto con los cachorros)
 4 Semanas postparto (junto con los cachorros)
 Cada 3 meses

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Ninguno de los 3 principios activos de DRONTAL® PLUS es teratogénico, embriotóxico o mutagénico.

DRONTAL® PLUS es la opción para el tratamiento de cachorros, adultos, hembras gestantes y en periodo de lactancia.

PRESENTACIONES: Caja con 24 tabletas.

Despachador con 13 blísters de 8 tabletas (104 tabletas fraccionables).

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Tel: 5713 2001

www.bayersanidadanimal.com.mx

www.mascotas.bayer.com.mx

Uso Veterinario.

Consulte al médico veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Drontal® Plus Reg: Q-0615-055

(Praziquantel, Pyrantel, Pamoato de Febantel)

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.



Drontal® Plus

Reg. Q-0615-055
Tabletas orales
Desparasitante de amplio espectro para perros

FÓRMULA:

Praziquantel	175 mg
Pyrantel	504 mg
Febantel	525 mg



Calendario de desparasitación estratégica



Cachorros

Cada 2 semanas (de 2 semanas a 3 meses de vida)
Cada mes (de 3 a 6 meses de vida)
Cada 3 meses (a partir de 6 meses de vida)



Nuevas mascotas

Inmediatamente
Repetir en 2 semanas
Cada 3 meses



Adultos

Cada 3 meses



Perras de crianza

Antes de la monta
Momento del parto
2 Semanas postparto (junto con los cachorros)
4 Semanas postparto (junto con los cachorros)
Cada 3 meses

USO EN:



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: DRONTAL® PLUS es un desparasitante de amplio espectro, compuesto por una combinación de praziquantel, pamoato de pyrantel y febantel (combinación sinérgica).

INDICACIONES: DRONTAL® PLUS posee un espectro de acción amplio. Los ámbitos de aplicación son en las infestaciones por los cestodos y nematodos del perro:

Nematodos: *Toxocara canis* y *Toxascaris leonina*.

Anquilostomas como: *Uncinaria stenocephala* y *Ancylostoma caninum*.

Tricúridos como: *Trichuris vulpis*.

Protozoarios: *Giardia spp.*

Cestodos como: *Echinococcus spp.*, *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Multiceps spp.* y *Mesocostoides spp.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

DOSIS: 1 tableta por cada 35 kg de peso corporal en ambas. Para el tratamiento de *Giardia spp.* se recomienda administrar 1 tableta por cada 10 kg de p.v.c. durante 3 días consecutivos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Ninguno de los 3 principios activos de DRONTAL® PLUS es teratogénico, embriotóxico o mutagénico.

DRONTAL® PLUS es la opción para el tratamiento de cachorros, adultos, hembras gestantes y en periodo de lactancia.

PRESENTACIONES: Despachador con 10 blísters de 2 tabletas, cada una para 35 kg de peso corporal. Tabletas fraccionables.

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.

Tel: 5713 2001

www.bayersanidadanimal.com.mx

www.mascotas.bayer.com.mx

Uso Veterinario.

Consulte al médico veterinario.

Su venta requiere receta médica.

Drontal® Plus Reg: Q-0615-055

(Praziquantel, Pyrantel, Pamoato de Febantel)

PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO.