

21.12.2022

Коротка характеристика препарату

1. Назва

ПРОФЕНДЕР™ для собак

2. Склад

Одна таблетка містить діючі речовини:

празіквантел – 50 мг (mg)

емодепсид – 10 мг (mg).

Допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат ангідрид, целюльоза мікрокристалічна, діоксид кремнію, ангідрид кварцю колоїдний, натрію кроскармелоза, стеарат магнію, повідон, ароматизатор яловичини.

3. Фармацевтична форма

Таблетки.

4. Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51 празіквантел, комбінації)

Властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин - емодепсину та празіквантелу.

Емодепсид – напівсинтетична сполука, яка належить до групи депсипептидів. Емодепсид ефективний проти *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* та *Trichuris vulpis*. Стимулює пресинаптичні латрофілінові нервові рецептори паразитів, що призводить до паралічу та їх загибелі.

Празіквантел – є похідним піразинізохінолонів, ефективний проти цестод *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia spp.*

Празіквантел швидко всмоктується зовнішньою оболонкою стьожкових гельмінтів, у результаті чого оболонка руйнується та настає параліч гельмінтів. Така швидка дія зумовлена зміною проникливості клітинної мембрани до іонів кальцію. Подібне порушення метаболізму спричиняє швидку загибель паразиту.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування собак при змішаних паразитарних інвазіях, спричинюваних гастро-інтестинальними нематодами (круглими гельмінтами) та цестодами (стьожковими гельмінтами):

- нематоди - зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 3 та 4 стадії) *Toxocara canis*; зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 4 стадії) *Toxascaris leonina*; зрілі, незрілі форми *Ancylostoma caninum*; зрілі, незрілі форми *Uncinaria stenocephala*; зрілі, незрілі та личинкові форми (4 стадії) *Trichuris vulpis*;

- цестоди - плоскі гельмінти (цестоди): зрілі форми *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*; зрілі, незрілі форми *Echinococcus multilocularis*; зрілі, незрілі форми *Echinococcus granulosus*.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати цуценятам, віком до 12 тижнів або масою тіла меншою 1 кг.

Не застосовувати при відомій гіперчутливості до діючих речовин препарату.

5.4 Побічна дія

Іноді є випадки розладів травного каналу (гіперсаливація, блювота), короточасні неврологічні розлади (тремор, порушення координації) легкого ступеня.

Неврологічні розлади мають більш важкий ступінь у івермектин чутливих порід собак (коллі, шелті і австралійські вівчарки).

5.5 Особливі застереження при використанні

При частому застосуванні антигельмінтних препаратів певного класу у паразитів розвивається

21.12.2022

резистентність відносно цього класу препаратів.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості


Застережень немає.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з препаратами, що містять Р-глікопротеїну (івермектин або інші макроциклічні лактони, еритроміцин, преднізолон та циклоспорин). Одночасне застосування посилює фармакокінетичну дію.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат застосовують перорально одноразово. Мінімальна рекомендована доза емодепсиду - 1 мг/кг маси тіла та празіквантелу - 5 мг/кг маси тіла.

Маса тіла (кг)	Кількість таблеток Профендер™ для собак		
	Малі собаки  3 кг	Середні собаки  10 кг	Великі собаки  30 кг
1– 1.5	½		
> 1.5– 3	1		
> 3– 4.5	1 ½		
> 4.5– 6	2		
> 6– 10		1	
> 10– 15		1 ½	
> 15– 20		2	
> 20– 30			1
> 30– 45			1 ½
> 45– 60			2

Препарат (таблетки) мають смак і запах м'яса, тому тварини поїдають його без примусу.

Застосовувати тільки після голодної дієти (якщо застосування препарату планують на ранок, собаку не годувати ввечері)!

Після застосування препарату собаку не годувати 4 години!

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При п'ятикратному передозуванні спостерігали тремор м'язів, порушення координації та пригнічення. У собак породи коллі поріг безпечності нижчий, порівняно із собаками інших порід, у них спостерігали тремор/атаксію при двократному передозуванні. Симптоми передозування швидко проходять без застосування терапії.

При застосуванні препарату і одночасному годуванні підвищується ймовірність виникнення симптомів передозування.

5.10 Спеціальні застереження

При інвазії *Dipylidium caninum* тварин обробляють проти проміжних господарів (бліх та вошей) з метою попередження повторного зараження.

21.12.2022

Застосування препарату тваринам з важкими захворюваннями печінки та нирок ґрунтуються на оцінці ризику та необхідності лікування.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначають.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

При випадковому потрапленні препарату всередину шлунково-кишкового тракту, особливо у дітей, негайно звернутися за медичною допомогою та показати етикетку або листівку-вкладку до препарату.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомі.

6.2 Термін придатності

Три роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати в упакованні виробника.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Картонні коробки, що містять блістери з алюмінієвої фольги. Таблетки випускають в упакованнях: для собак середніх розмірів - Профендер™ для собак (таблетки 50 мг/10 мг): 24 таблетки (4 блістери по 6 таблеток).

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний або протермінований препарат утилізують відповідно до чинного законодавства.

Невикористані частини таблеток не можна зберігати з метою використання у майбутньому.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ
Хайнц-Ломан-Штр. 4,
27472 Куксхафен, Німеччина

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4,
27472 Cuxhaven, Germany

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проєнсдорфер стр. 324,
24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma + Veterinar-Product GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel, Germany

9. Додаткова інформація

21.12.2022

ПРОФЕНДЕР™ для собак
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки у формі кісточки.

Склад

Одна таблетка містить діючі речовини:

празіквантел – 50 мг (mg)

емодепсид – 10 мг (mg).

Допоміжні речовини: кальцію гідрофосфат ангідрид, целюльоза мікрокристалічна, діоксид кремнію, ангідрид кварцю колоїдний, натрію кроскармелоза, стеарат магнію, повідон, ароматизатор яловичини.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51 празіквантел, комбінації)

Властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин - емодепсину та празіквантелу.

Емодепсид – напівсинтетична сполука, яка належить до групи депсипептидів. Емодепсид ефективний проти *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala* та *Trichuris vulpis*. Стимулює пресинаптичні латрофілінові нервові рецептори паразитів, що призводить до паралічу та їх загибелі.

Празіквантел – є похідним піразинізохінолонів, ефективний проти цестод *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia spp.*

Празіквантел швидко всмоктується зовнішньою оболонкою стьожкових гельмінтів, у результаті чого оболонка руйнується та настає параліч гельмінтів. Така швидка дія зумовлена зміною проникливості клітинної мембрани до іонів кальцію. Подібне порушення метаболізму спричиняє швидку загибель паразиту.

Застосування




Профілактика та лікування собак при змішаних паразитарних інвазіях, спричинюваних гастро-інтестинальними нематодами (круглими гельмінтами) та цестодами (стьожковими гельмінтами):

• нематоди - зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 3 та 4 стадії) *Toxocara canis*; зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 4 стадії) *Toxascaris leonina*; зрілі, незрілі форми *Ancylostoma caninum*; зрілі, незрілі форми *Uncinaria stenocephala*; зрілі, незрілі та личинкові форми (4 стадії) *Trichuris vulpis*;

• цестоди - плоскі гельмінти (цестоди): зрілі форми *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*; зрілі, незрілі форми *Echinococcus multilocularis*; зрілі, незрілі форми *Echinococcus granulosus*.

Дозування

Препарат застосовують перорально одноразово. Мінімальна рекомендована доза емодепсиду - 1 мг/кг маси тіла та празіквантелу - 5 мг/кг маси тіла.

Маса тіла (кг)	Кількість таблеток Профендер™ для собак		
	Малі собаки  3 кг	Середні собаки  10 кг	Великі собаки  30 кг
1– 1.5	½		

21.12.2022

> 1.5– 3	1		
> 3– 4.5	1 ½		
> 4.5– 6	2		
> 6– 10		1	
> 10– 15		1 ½	
> 15– 20		2	
> 20– 30			1
> 30– 45			1 ½
> 45– 60			2

Препарат (таблетки) мають смак і запах м'яса, тому тварини поїдають його без примусу.

Застосовувати тільки після голодної дієти (якщо застосування препарату планують на ранок, собаку не годувати ввечері)!

Після застосування препарату собаку не годувати 4 години!

Протипоказання

Не застосовувати цуценятам, віком до 12 тижнів або масою тіла меншою 1 кг.

Не застосовувати при відомій гіперчутливості до діючих речовин препарату.

Застереження

Після роботи з препаратом необхідно вимити руки з милом.

При випадковому потрапленні препарату всередину (ШКТ), особливо у дітей, негайно звернутися за медичною допомогою та показати етикетку або листівку-вкладку до препарату.

Форма випуску

Картонні коробки, що містять блістери з алюмінієвої фольги. Таблетки випускають в упакованнях: для собак середніх розмірів - Профендер™ для собак (таблетки 50 мг/10 мг): 24 таблетки (4 блістери по 6 таблеток),

Зберігання

Зберігати в упакованні виробника.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ
Хайнц-Ломан-Штр. 4,
27472 Куксхафен, Німеччина

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann-Str. 4,
27472 Cuxhaven, Germany

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проенсдорфер стр. 324,
24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma + Veterinar-Product GmbH
Projensdorfer Str. 324,
24106 Kiel, Germany