

3 1. 0 5. 2021

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

Дронтал® Плюс XL зі смаком м'яса

### 2. Склад

1 таблетка містить діючі речовини:

фебантел - 525,0 мг;

пірантелу ембонат - 504,0 мг;

празіквантел - 175,0 мг.

Допоміжні речовини: кукурудзяний крохмаль, моногідрат лактози, мікрокристалічна целюлоза, повідон К25, магнію стеарат, натрію лаурилсульфат, колоїдний діоксид кремнію, кроскармелоза натрію, м'ясний ароматизатор.

### 3. Фармацевтична форма

Таблетки.

### 4. Фармакологічні властивості

*ATC vet QP52 антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)*

#### 1. Фармакодинаміка

Дронтал® Плюс XL зі смаком м'яса - антигельмінтик, ефективний проти круглих та стъожкових гельмінтів, а також лямблій. Містить діючі речовини: фебантел, пірантелу ембонат, празіквантел.

Комбінація діючих речовин *пірантелу* та *фебантелу*, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод (токсокар, токсаскарид, унцинарій та анкілостом, волосоголовців) у собак: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, а також проти лямблій *Giardia spp.*

Празіквантел активний проти цестод у собак: *Taenia species*, *Dipylidium caninum*, *Echinococcus granulosus* та *Echinococcus multilocularis*. Празіквантел діє проти всіх кишкових стадій цих паразитів.

#### 2. Фармакокінетичні властивості

Пірантел діє як холінергічний антагоніст ацетилхолінових рецепторів, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполяризуючої нервово-м'язової блокади.

Антигельмінтна ефективність та лямбліоцидний ефект фебантелу зумовлений його здатністю гальмувати процес полімеризації тубуліну в мікроканальцях. У результаті структурних та функціональних метаболічних розладів виснажуються енергетичні запаси паразитів, внаслідок чого наступає їх загиbelь на 2-3 добу.

Празіквантел швидко всмоктується через зовнішню оболонку стъожкових гельмінтів, внаслідок чого настає її пошкодження та скорочення. Це призводить до руйнування зовнішньої оболонки, розладів метаболізму і загибелі паразита.

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1 Вид тварин

Собаки.

#### 5.2 Показання до застосування

Лікування собак при змішаних паразитарних інвазіях, спричинюваних гельмінозами травного каналу:

- нematodi - *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*.

- цестоди - *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Mesocestoides spp.*

Лікування лямбліозу (*Giardia spp.*) у собак та цуценят.

#### 5.3 Протипоказання

Не застосовувати тваринам з гіперчувствістю до складників препарату.

31.05.2021

Не застосовувати собакам масою тіла менше 7 кг.

#### 5.4 Побічна дія

У дуже рідких випадках (<1 з 10000) можливі легкі та швидкоминучі розлади шлунково-кишкового тракту (наприклад, блювота).

#### 5.5 Особливі застереження при використанні

Блохи слугують проміжними хазяїнами для стъожкових гельмінтів *Dipylidium caninum*, тому для запобігання повторного зараження тварин диплідіозом слід вжити заходів щодо контролю переносників захворювань, таких як блохи та миші, в оточенні тварини.

Для запобігання повторного зараження всі тварини, що утримуються разом, повинні проходити дегельмінтизацію одночасно.

Прибирання та гігієна після дегельмінтизації вкрай важливі для профілактики повторного зараження та розповсюдження інвазії. Слід вимити та продезінфікувати предмети, які можуть бути забруднені фекаліями.

#### 5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Пепарат не застосовують самкам у перші два триместри вагітності.

Застосування препарату протягом 3-х днів поспіль для лікування лямбліозу під час третього триместру вагітності повинно ґрунтуватися на оцінці лікарем ветеринарної медицини ризику та необхідності лікування.

#### 5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовують одночасно з препаратами на основі піперазину.

#### 5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Рекомендована доза - 1 таблетка на 35 кг маси тіла тварини (15 мг фебантелу, 14,4 мг пірантелу ембонату та 5 мг празіквантелу на 1 кг маси тіла).

Маса тіла, кг	Кількість таблеток
7-17,5	½
>17,5 - 35	1
>35 - 52,5	1 ½
>52,5 - 70	2

На кожні наступні 17,5 кг маси тіла застосовувати додатково половину таблетки.

Застосування: перорально, таблетку задають з кормом або без.

Застосування препарату не вимагає дотримання дієти.

Тривалість лікування: одноразово. При високому ступені інвазії шлунково-кишковими нематодами або при ехінококозі можлива необхідність повторного застосування (за призначенням лікаря ветеринарної медицини).

Лікування інвазій спричинених лямбліями (*Giardia spp.*): препарат застосовують три дні поспіль у рекомендованих дозах.

#### 5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При передозуванні собакам та цуценятам рекомендованої дози препарату у 10 разів побічних реакцій не виявлено.

#### 5.10 Спеціальні застереження

Часте використання антигельмінтних препаратів будь-якого класу може привести до виникнення резистентності до діючої речовини.

#### 5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не визначають.

#### 5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Після застосування препарату слід помити руки водою.

*Giardia spp.* може уражати людей, тому зверніться до лікаря, якщо у Вашого собаки виявлене зараження лямбліями.

При випадковому заковтуванні препарату зверніться до лікаря та покажіть листівку

31.05.2021

вкладку до препарату.

**6. Фармацевтичні особливості**

**6.1 Форми несумісності (основні)**

**Невідомо.**

**6.2 Термін придатності**

4 роки.

Термін придатності після розкриття первинної упаковки з фольги (або розділених таблеток) – 7 діб.

**6.3 Особливі заходи зберігання**

Зберігати препарат у сухому недоступному для дітей та тварин місці, окрім від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 25 °C.

**6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування**

Блістери з фольги по 2, 4, 8, 24, 48 таблеток, запаковані у картонні коробки.

**6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками**

Невикористаний препарат та його залишки утилізують відповідно до чинного законодавства.

**7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення**

Байєр Енімал Хелс ГмбХ

Bayer Animal Health GmbH

D-51368, Леверкузен, Німеччина

D-51368, Leverkusen, Germany

**8. Назва і місце знаходження виробника**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,

KVP Pharma and Veterinar-Produkt GmbH

Проєнсдорфер Стр. 324,

Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel, Germany

D-24106 Кіль, Німеччина

**9. Додаткова інформація**