

BLANDEVEJLEDNING

Udfordring	Antal fugle	Mængde GALLIPRO® FIT Drink
Opstart	1.000	10g/dag - Fra dag 0 til 7-10 dage
Våd strøelse	1.000	10g/dag - Fra dag 0 til 21 dage
Fødevarerikkerhed ved udtynding	1.000	10g/dag - 3-5 dage før og 3-5 dage efter udtynding

1. Bekræft antallet af fugle og beregn den daglige mængde probiotika og vand, der skal bruges i stamopløsningen, ud fra de sidste dages vandforbrug.
2. Sørg for, at spanden til stamopløsningen er ren og skyllet og helt fri for sæberester. Brug gerne samme spand – og kun den – til GALLIPRO® FIT Drink. Spanden skal dog rengøres hver dag. Tilsæt tilstrækkeligt drikkevand til mindst 4 timers forbrug. Brug den genererede rapport, hvis den findes, som vejledning.
3. Vej mængden af probiotika og bland probiotikaen med drikkevand i spanden. Ved større mængder (>200 g) kan produktet med fordel drysses langsomt ned i vandet. Sørg for at røre regelmæssigt med et rent piskeris (bland ikke med andre tilsætningsstoffer). Fortsæt med at røre, indtil opløsningen er ensartet - dette kan tage op til 5 min.
4. Placer spanden ved doseringsanlægget, f.eks. Dosatron, og læg pumpen ned i spanden.
5. Tænd doseringspumpen og lad den være tændt, indtil stamopløsningen er brugt op. Start ved trin 1 næste gang GALLIPRO® FIT Drink skal bruges.



For yderligere information kontakt venligst Camilla Fisker hos Elanco
Camilla.fisker@elancoah.com eller mobil 25 66 00 03

MIXING INSTRUCTION

Challenge	Number of birds	Quantity of GALLIPRO® FIT Drink
Early life	1.000	10g/day - From day 0 to 7-10 days
Wet litter prevention	1.000	10g/day - From day 0 to 21 days
Pre-harvest food safety	1.000	10g/day - 3-5 days before and 3-5 days after pre-harvest

1. Verify the number of birds and calculate the amount of daily probiotics and water required in stock solution, based on the water consumption of the last days.
2. Make sure that the bucket for the stock solution is clean and rinsed and completely free of soap residue. Use the same bucket - and only this - for GALLIPRO® FIT Drink. Still the bucket needs to be cleaned everyday. Add sufficient drinkable water for, at least, 4 hours consumption. Use the report generated for you as guidance.
3. Weigh the amount of probiotic and mix the probiotic with drinkable water in the bucket. For larger quantities (>200 g), the product can be sprinkled slowly into the water. Make sure to stir it regularly with a clean whisk (do not mix with other additives inside). Continue stirring until obtaining a homogeneous solution - this can take up to 5 min.
4. Place the bucket by the dosing system, e.g. Dosatron, and place the pump in the bucket.
5. Turn on the dosing pump and keep on until the stock solution is finished. Start at step 1 the next day of administration.



For further information please contact Camilla Fisker at Elanco
Camilla.fisker@elancoah.com or mobile +45 25 66 00 03