

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Дронтал™ для котів

2. Склад

Одна таблетка (339 мг (mg)) містить діючі речовини:
пірантелу ембонат - 230 мг (mg);
празіквантел - 20 мг (mg).

Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, повідон K25, стеарат магнію, кремнезем колоїдний безводний, кукурудзяний крохмаль, гіпромелоза, поліетиленгліколь, діоксид титану Е171.

3. Фармацевтична форма

Таблетки.

4. Фармакологічні властивості

ATCvet QP52, антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51 празіквантел, комбінації)

Дронтал™ для котів - це антигельмінтний препарат широкого спектру дії, який містить діючі речовини празіквантел, похідне піразинізохінолону, та пірантелу ембонат, похідне тетрагідропіrimідину.

Празіквантел швидко всмоктується зовнішньою оболонкою стъожкових гельмінтів, внаслідок чого настає її пошкодження та скорочення, що призводить паралічу паразитів.

Пірантел діє як холінергічний антагоніст, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполяризуючої нервово-м'язової блокади.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти.

5.2 Показання до застосування

Дегельмінтизація котів при ураженні цестодами і нематодами: *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis*, *Taenia (Hydatigera) taeniaeformis*, *Mesocestoides spp.*, *Joyeuxiella pasqualei*, *Toxocara cati* (syn. *T. mystax*), *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати кошенятам віком до 3-х тижнів!

5.4 Побічна дія

Не встановлена.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати препарат тваринам під час вагітності.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не відома.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Застосовують препарат перорально одноразово, таблетки можуть задаватися безпосередньо всередину (*per os*) або у подрібненому виді з кормом, без дотримання голодної дієти, у дозі - 1 табл./4 кг маси тіла тварини (еквівалентно 5 мг празіквантелу та 57,5 мг пірантелу ембонату/кг маси тіла):

Маса тіла тварини (кг)	Кількість таблеток
1,0 – 2,0	0,5
2,1 – 4,0	1,0
4,1 – 6,0	1,5
6,1 – 8,0	2,0

22.07.2022

Не застосовувати кошенятам віком до 3-х тижнів та масою тіла до 1 кг.

Дегельмінтизацію тварин рекомендується проводити 1 раз у квартал.

Кошенят проти круглих гельмінтів (аскарид) рекомендують дегельмінтизувати двічі з інтервалом 14 діб за 2-3 тижні після відлучення.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Симптоми передозування можливі лише при передозуванні препарату у 5 разів від терапевтичної дози. Першою ознакою передозування є блівота.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин період виведення не визначають.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При роботі з препаратом необхідно дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не встановлені.

6.2 Термін придатності

5 років.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати препарат у закритому упакуванні виробника у сухому, недоступному для дітей та тварин, місці окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 0 до 30 °C.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Блістери з фольги по 8 таблеток. Три блістери (24 таблетки) упаковані у картонну коробку.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат, його залишки та упакування утилізують у відповідно до чинного законодавства.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Еланко ГмбХ

Хайнц-Ломан-Штр. 4, 27472 Куксхафен

Німеччина

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4, 27472 Cuxhaven

Germany

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

Проенсдорфер стр. 324,

D-24106 Кіль, Німеччина

KVP Pharma + Veterinar-Product GmbH

Projensdorfer Str. 324,

D-24106 Kiel, Germany

9. Додаткова інформація