

Advantix Spot-on (40 mg + 200 mg)/ 0,4 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (100 mg +500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania;
Advantix Spot-on (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Niemcy

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych

1 pipeta 0,4 ml zawiera: Imidaklopid 40 mg, Permetryna 200 mg; 1 pipeta 1,0 ml zawiera: Imidaklopid 100 mg, Permetryna 500 mg; 1 pipeta 2,5 ml zawiera: Imidaklopid 250 mg, Permetryna 1250 mg; 1 pipeta 4,0 ml zawiera: Imidaklopid 400 mg, Permetryna 2000 mg

Wskazania lecznicze

Zapobieganie i zwalczanie infestacji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*) oraz pcheł (*Ctenocephalides spp.*) u psów, a także odstraszanie komarów i muchówek (*Phlebotomus sp.*).

Przeciwwskazania

Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.