

NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO: Foresto 1,25 g + 0,56 g obroża lecznicza dla kotów i psów ≤ 8 kg; Foresto 4,50 g + 2,03 g obroża lecznicza dla psów > 8 kg. **SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY:** Każda obroża o długości 38 cm (12,5 g) zawiera: **Substancje czynne:** Imidaklopryd 1,25 g, Flumetryna 0,56 g; Każda obroża o długości 70 cm (45 g) zawiera: **Substancje czynne:** Imidaklopryd 4,50 g, Flumetryna 2,03 g. Obroża w kolorze szarym, bezzapachowa z wytłoczoną nazwą weterynaryjnego produktu leczniczego po jednej stronie. **Docelowe gatunki zwierząt:** Koty, psy. **Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:** **Koty:** Dla kotów z mieszanymi inwazjami pcheł oraz kleszczy czy też zagrożonych takimi inwazjami. Weterynaryjny produkt leczniczy jest wskazany do stosowania tylko wtedy, gdy uzasadnione jest jego użycie przeciwko wskazanym pasożytom w tym samym czasie. Leczenie inwazji pcheł i zapobieganie ponownej inwazji pcheł (*Ctenocephalides felis*) dzięki działaniu owadobójczemu przez 7 do 8 miesięcy. Chroni bezpośrednio otoczenie zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 10 tygodni. Weterynaryjny produkt leczniczy może być stosowany w ramach strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD), w przypadku wcześniejszego rozpoznania przez lekarza weterynarii. Zapobieganie ponownej inwazji kleszczy (*Ixodes ricinus*) dzięki działaniu roztoczebójczemu (zabijającemu) i odstrasżającemu (zapobiegającemu żerowaniu) od 2 dni do 8 miesięcy. Zapobieganie ponownej inwazji kleszczy (*Rhipicephalus turanicus*) dzięki działaniu roztoczebójczemu (zabijającemu) od 2 dni do 8 miesięcy. Produkt wykazuje skuteczne działanie przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. **Psy:** Dla psów z mieszanymi inwazjami pcheł lub wszy oraz kleszczy lub much piaskowych czy też zagrożonych takimi inwazjami. Weterynaryjny produkt leczniczy jest wskazany do stosowania tylko wtedy, gdy w tym samym czasie uzasadnione jest jego użycie przeciwko pasożytom, na które działa każda z substancji czynnych. Leczenie inwazji pcheł i zapobieganie ponownej inwazji pcheł (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) dzięki działaniu owadobójczemu przez 7 do 8 miesięcy. Chroni bezpośrednio otoczenie zwierzęcia przed rozwojem larw pcheł przez 8 miesięcy. Weterynaryjny produkt leczniczy może być stosowany w ramach strategii leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (FAD), w przypadku wcześniejszego rozpoznania przez lekarza weterynarii. Zapobieganie ponownej inwazji kleszczy (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) dzięki działaniu roztoczebójczemu (zabijającemu) i odstrasżającemu (zapobiegającemu żerowaniu) od 2 dni do 8 miesięcy. Zapobieganie ponownej inwazji kleszczy (*Dermacentor reticulatus*) dzięki działaniu roztoczebójczemu (zabijającemu) od 2 dni do 8 miesięcy. Produkt jest skuteczny przeciwko larwom, nimfom i dorosłym osobnikom kleszczy. Zmniejszenie ryzyka przeniesienia patogenów *Babesia canis vogeli* oraz *Ehrlichia canis*, a tym samym zmniejszenie ryzyka babeszjozy u psów oraz erlichiozy u psów przez 7 miesięcy dzięki działaniu roztoczebójczemu i odstrasżającemu na kleszcze *Rhipicephalus sanguineus*. Efekt jest pośredni, ze względu na działanie produktu na wektor. Zmniejszenie ryzyka przeniesienia patogenu *Leishmania infantum* do 8 miesięcy, a tym samym zmniejszenie ryzyka leishmaniozy u psów, poprzez działanie odstrasżające na muchy piaskowe. Efekt jest pośredni, ze względu na działanie produktu na wektory. Leczenie inwazji wszołów (*Trichodectes canis*). **NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO:** Elanco Animal Health GmbH. **Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**