

**Kiltix dla małych psów, 1,25 g + 0,28 g, obroża**  
**Kiltix dla średnich psów, 3,02 g + 0,68 g, obroża**  
**Kiltix dla dużych psów, 4,5 g + 1,013 g, obroża**

#### **Podmiot odpowiedzialny**

Bayer Animal Health GmbH, 51368 Leverkusen, Niemcy

#### **Zawartość substancji czynnej (-ych) i innych substancji**

1 obroża o masie 12,5 g zawiera:

Substancje czynne: propoksur 1,25 g, flumetryna 0,28 g

1 obroża o masie 30,2 g zawiera:

Substancje czynne: propoksur 3,02 g, flumetryna 0,68 g

1 obroża o masie 45 g zawiera:

Substancje czynne: propoksur 4,5 g, flumetryna 1,013 g

#### **Wskazania lecznicze**

Do zwalczania i ochrony przed inwazją kleszczy z gatunku *Rhipicephalus sanguineus* oraz *Ixodes ricinus*, jak też pcheł *Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis* u psów.

Działanie preparatu rozpoczyna się w ciągu pierwszej doby od założenia obroży i utrzymuje się przez sześć miesięcy w przypadku Kiltixu dla małych psów i siedem miesięcy w przypadku Kiltixu dla średnich i dużych psów.

#### **Przeciwwskazania**

Nie stosować u psów z ranami skóry.

Nie stosować u zwierząt w przypadku istnienia mechanicznej niedrożności w obrębie układu pokarmowego lub moczowego, astmy oskrzelowej bądź innych dolegliwości płucnych oraz sercowo-naczyniowych ponieważ karbaminiany mogą wyzwać skurcz mięśni gładkich. Nie stosować u szczeniąt poniżej trzech miesięcy życia.

Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

**Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.**