

ADVANTAGE MULTI  
(perros)

Reg. RSCO-PEC-INAC-0199-0089-359-10

FICHA TÉCNICA

## USO VETERINARIO

## CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Insecticida, acaricida, endoparasiticida de uso pecuario en perros

## COMPOSICIÓN PORCENTUAL

**Ingrediente activo:**Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazoli-din-2-ilidenamina ..... 10.00%  
(Equivalente a 109.80 g de i.a./L a 20°C)Moxidectina: 3-(O-methyloxime)-F28249-alpha..... 2.50%  
(Equivalente a 27.45 g de i.a./L)**Ingredientes inertes:**

Solventes y Antioxidante..... 87.50%

TOTAL ..... 100.00%

La moxidectina es un endoparasiticida sistémico que controla estados larvarios (L3, L4) de los siguientes parásitos internos: *Dirofilaria immitis* y nematodos gastrointestinales. Interfiere con diferentes receptores GABA y los canales de cloruro de glutamato de los parásitos causándoles parálisis, flacidez seguida de la muerte y/o expulsión

TIPO DE FORMULACIÓN: Solución tópica

INGREDIENTE ACTIVO: Imidacloprid y moxidectina



Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo por el contacto con la piel  
Nocivo si se inhala  
Precaución



USO VETERINARIO

**INSTRUCCIONES DE USO**
**INFORMACIÓN GENERAL**

ADVANTAGE MULTI es una solución tópica compuesta de un insecticida ectoparasiticida (imidacloprid) y un ingrediente endoparasiticida de uso farmacéutico (moxidectina) para usarse en perros para el control de pulgas (*Ctenocephalides felis*), ácaros (*Otodectes cynotis*), parásitos intestinales como lombrices (*Ancylostoma tubaeforme*, *Toxocara cati*) y gusano del corazón (*Dirofilaria immitis*).

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN**

Especie	Peso corporal	Dosis (pipeta)	Plaga
Perros	4 Kg	0.4 ml	<b>Pulgas:</b> <i>Ctenocephalides felis</i> <b>Piojos masticadores:</b> <i>Trichodectes canis</i> <b>Ácaros de las orejas:</b> <i>Otodectes cynotis</i> <b>Ácaros de la sarna:</b> <i>Sarcoptes scabiei var. canis</i> <b>Demodicosis:</b> <i>Demodex canis</i>  <b>Gusano del Corazón:</b> <i>Dirofilaria immitis</i>  <b>Parásitos intestinales (lombrices):</b> <i>Angiostrongylus vasorum</i> <i>Ancylostoma tubaeforme</i> <i>Crenosoma vulpis</i> <i>Toxocara canis</i>
	10 Kg	1.0 ml	
	10 a 25 Kg	2.5 ml	
	Más de 25 Kg	4.0 ml	
	Más de 40 Kg	4.0 ml (2 pipetas de)	


**Vía de administración:** tópica (unción dorsal)

**Frecuencia de aplicación:** Repetir la aplicación según sea necesario

**Intervalo entre cada aplicación:** Esperar el tiempo necesario entre cada aplicación de ADVANTAGE MULTI.

**Método de aplicación del producto:**

- Determine el peso del animal para calcular la dosis a aplicar
- Seleccionar la presentación de adecuada del producto según el peso del animal.
- Sacar una pipeta del paquete, poner el producto en posición vertical (hacia arriba la tapa).
- Quitar la tapa de la pipeta, invertirla, colocarla sobre el tubo y girarla hasta que se rompa el sello.
- Retirar la tapa.




6. Colocar el extremo de la pipeta sobre la piel y apretar firmemente, para aplicar directamente el producto sobre la piel. De preferencia el animal debe estar parado.

**USO VETERINARIO**

- a. En perros pequeños y medianos separar el pelo entre las escápulas hasta ver la piel y aplicar



- b. En perros grandes separar el pelo en cuatro diferentes puntos a lo largo del dorso del animal hasta ver la piel y aplicar el contenido



### CONTRAINDICACIONES

Evitar el contacto del producto con los ojos y boca del animal.

### SEGURIDAD

**Peligros de toxicidad del plaguicida para la especie animal a la que se aplique, así como para los animales que se encuentran próximos durante la aplicación:** No se han reportado signos de intolerancia a sobredosis, en el perro puede presentarse salivación si éste se lame la piel, este es signo de intoxicación y desaparece minutos después de la aplicación del producto. Esto se evita si se aplica el producto en la nuca del perro, para evitar que se lama. Retirar a todos los animales que no vayan a ser tratados con el producto.

**Tiempo de reentrada a los lugares tratados:** Es posible entrar en contacto con los animales tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 minutos posteriores a la aplicación.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de ADVANTAGE® MULTI deberá utilizar, bata, guantes de vinilo o nitrilo y lentes de seguridad.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZADO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA**



### PRIMEROS AUXILIOS

Retirar a la persona de la zona de intoxicación. Quitarle inmediatamente la ropa contaminada. Acostar y trasportar al afectado en posición lateral estable. En caso de contacto con los ojos enjuagarlos cuidadosamente con agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón. En caso de ingestión y si la situación de la persona lo permite, dar a ingerir un vaso con agua. No provocar el vómito. Consúltese al médico inmediatamente.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Insecticida del grupo químico de los neonicotinoides.

**Signos y síntomas de intoxicación por vía oral, dérmica e inhalatoria:** en caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles.

**Antídoto:** no existe antídoto específico.

**Tratamiento:** sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como laxantes salinos.

### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RIOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE SEMARNAT.
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ÉSTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES).
- CATEGORÍA EXOTOXICOLÓGICA: ÉSTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

### Elanco Salud Animal, S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro No.5153,

Piso 18, Col. Puerta de Hierro,

Zapopan C.P.45116, Jalisco.

Tel.:800 000 7387

e-mail: animal.health@sykes.com