

**DRONTAL PLUS + SABOR**

Reg. Q-0715-240

Antiparasitario oral de amplio espectro en tabletas para perros de 10 kg**FÓRMULA:**

Febantel150 mg
Embonato de pirantel144 mg
Praziquantel50 mg

TIPO DE FORMULACIÓN: Tabletas**INGREDIENTES ACTIVOS:** Febantel, Embonato de pirantel y Praziquantel**INDICACIONES:**

Drontal Plus + Sabor actúa con total eficacia frente a los siguientes parásitos:

Nemátodos: Ascaridos (adultos y formas inmaduras tardías) de: *Toxocara canis* (adultos y formas inmaduras tardías) *Toxascaris leonina* (adultos y formas inmaduras tardías), *Uncinaria stenocephala* (adultos), *Ancylostoma caninum* (adultos), *Trichuris vulpis* (adultos), Cestodos: (adultos y formas inmaduras tardías) de: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., (en Chile *Taenia hidatygena*, *Taenia psiforme*, *Taenia ovis*), *Mesocestoides* spp., *Multiceps multiceps*, Protozoarios: *Giardia* spp., (en cachorros y perros adultos).

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Drontal Plus + Sabor, se administra por vía oral. Las tabletas están saborizadas y los estudios demuestran que son muy palatables por lo que los perros las ingieren voluntariamente en la mayoría de los casos probados. Colocar la(s) tableta(s) en la base de la lengua y asegurarse que sea(n) tragada(s) correctamente por la mascota. Las tabletas pueden ser administradas con o sin alimento. No es necesario limitar el acceso a la comida previo o posteriormente al tratamiento.

DOSIS:

1 tableta para perros de Drontal Plus + Sabor equivale a 5-12.5 mg de praziquantel, 14.4-36 mg de embonato de pirantel y 15-37.5 mg de febantel por kg de peso.

2 a 5 Kg de peso corporal: 1/2 tableta
>5 a 10 Kg de peso corporal: 1 tableta
>10 a 15 Kg de peso corporal: 1 1/2 tableta
>15 a 20 Kg de peso corporal: 2 tabletas

*Por cada 5 Kg de peso corporal adicional, administrar 1/2 tableta adicional.

Tratamiento para cestodos y nemátodos: administrar 1 sola toma.

Tratamiento para giardias: administrar tres días seguidos con intervalo de 24 horas.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

Se deberá establecer un programa de desparasitación consultando al Médico Veterinario. Como regla general para animales adultos mayores a 6 meses deberá utilizarse un esquema de aplicación cada tres meses. Si el dueño del animal elige no utilizar un tratamiento de desparasitación periódico, deberá examinarse la materia fecal cada tres meses. En situaciones específicas como perras lactantes, o animales jóvenes menores a 6 meses, o ambientes de criadero, se deberá utilizar con mayor frecuencia y buscar el asesoramiento de un Médico Veterinario para establecer un protocolo de desparasitación apropiado.

De igual manera, en situaciones tales como infestaciones graves de gusanos redondos o infestaciones por *Echinococcus* serán necesarios más tratamientos, de acuerdo al criterio del Médico Veterinario tratante.

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS:

Desparasite a todos los perros y gatos de la casa el mismo día.

CONTRAINDICACIONES:

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus principios activos. No utilizar durante los dos primeros tercios de la gestación. No utilizar en animales que pesan menos de 2 kg.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS:

No usar con otros colinérgicos (ej. levamisol). Potencial aumento del efecto de sustancias activas con actividad acetilcolinesterasa (ej. organofosforados). La actividad específica de piperazina (parálisis neuromuscular de parásitos) pueden inhibir la eficacia del pirantel (parálisis espástica de parásitos).

SOBREDOSIFICACIÓN Y EFECTOS ADVERSOS:

El producto posee un amplio margen de seguridad. Dosis de hasta 10 veces la recomendada no provoca signos adversos. En perros con infestaciones intensas por endoparásitos acompañadas de lesiones de la pared intestinal puede haber una mayor absorción del pirantel. Este incremento en la absorción puede provocar síntomas como temblor muscular, salivación, diarreas, evacuación intestinal y reducción de la actividad de la colinesterasa en sangre. Si aparecieran estos efectos adversos se debe administrar atropina como antídoto.

En casos muy raros pueden presentarse leves desórdenes del tracto digestivo leves y pasajeros (por ejemplo vómitos). La frecuencia de las reacciones adversas se define utilizando la siguiente leyenda: Muy raro (menos de 1 en 10.000 animales, incluyendo reportes aislados).

ADVERTENCIAS:

Las pulgas actúan como huéspedes intermediarios para el cestodo *Dipylidium caninum*. Por lo tanto deberá realizarse el control de los huéspedes intermediarios tales como pulgas, ratones, etc. para impedir la reinfestación por *Dipylidium caninum*.

PRECAUCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE TOMAR LA PERSONA QUE ADMINISTRE EL MEDICAMENTO VETERINARIO A LOS ANIMALES:

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y se deberá mostrar el prospecto o la etiqueta del producto al médico. Lavarse bien las manos luego de la manipulación del producto. *Giardia* spp. puede infestar a humanos, por lo tanto consulte al médico en caso de que la mascota contraiga la infestación.

Este medicamento veterinario contiene praziquantel por lo que es eficaz frente a *Echinococcus* spp. La Equinococosis representa un riesgo para los humanos. Como la Equinococosis es una enfermedad notificable ante la OIE, deberán seguirse guías específicas de tratamiento y seguimiento posterior, así como sobre la seguridad de las personas.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE PRODUCTO SIN UTILIZAR O EL MATERIAL DE DESECHO:

No arrojar el producto junto con los desechos domésticos. No eliminar en el suelo o en cursos de agua. Como producto medicinal, debe ser enviado a un servicio de recolección y eliminación de desechos especiales.



DRONTAL PLUS + SABOR
FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**

ALMACENAMIENTO:

Una vez abierto el blíster, los medios comprimidos restantes deben ser envueltos en papel de aluminio y regresados al blíster abierto y utilizarlos dentro de los 7 días de abierto el blíster. Almacenar a una temperatura entre 15°C y 30°C Almacenar fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Elanco Salud Animal S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro No.5153,
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,
Zapopan C.P. 45116, Jalisco.
Tel.: 800 288 5553